

## GUIDE DE SUIVI DES POPULATIONS DE **TORDEUSES**

Action financée par : Multiplicateurs semae ARVALIS de Semences Institut a végétal



## LA TORDEUSE DE LA LUZERNE


Ce petit papillon dont les larves dévorent les graines dans les gousses est repéré par l'intermédiaire de piège à phéromone sexuelle attractif. Seul le piège englué à phéromone permet sa détection. Les populations apparaissent et se développent en juin – juillet.

Édité par le service technique de la FNAMS – 2021 Crédit photos: FNAMS



## Positionnement du piège au champ

- Disposer 1 piège delta par parcelle (sur un piquet à hauteur de végétation)
- Placer 1 plaque engluée par piège et la changer chaque semaine
- Placer 1 capsule phéromone sur la plaque pour toute la saison de suivi
- Compter le nombre d'adultes par piège tous les 7 jours
- Mise en place du piège entre mi- et fin-juin (à partir floraison) et jusqu'à stade gousses brunes (4 à 6 semaines de suivi)



Piège delta à hauteur de végétation



Capsule de phéromone



Tordeuses collées sur plaque engluée

## Acheter le matériel

Commander auprès de https://www.pheromonesbioprox.com/fr/ Choisir des capsules de Tordeuse de la luzerne (Laspeyresia medicaginis)

Type	Tarif unitaire (HT) (données non contractuelles)
1 piège delta	~6€
10 plaques engluées	~15€
1 capsule phéromone	~4€